EQUISTRO B-CAROTIN

Aliment complémentaire pour chevaux reproducteurs, riche en β-carotène. Pour préparer les chevaux reproducteurs à la période de monte.

2. Type et catégorie d'aliment

Aliment complémentaire destiné aux chevaux

3. Composition par ordre de poids décroissant

Glucose, Huile de poisson 8%, Carbonate de calcium.
Constituants analytiques : Cendres brutes 11,6%, Humidité 8%, Protéines brutes 5,5%, Cendres insolubles dans HCL 5%, Matières grasses brutes 4,5%, Sodium 1,3%.Cellulose brute 0,3%

4. Liste des additifs (par kilo)

Vitamines et provitamines: Vitamine A (E672) 200 000 Ui, Béta-carotène (E 160a) 10 000 mg, Vitamine E (s.f. acétate d‘alpha tocophérol) 10 000 mg. Composés d‘oligo-éléments: Fer s.f. oxyde ferrique (E1) 1 700 mg

5a. Propriétés propres aux ingrédients

Le β-carotène est utilisé par l'organisme comme pro-vitamine A, précurseur de la vitamine A. Il est impliqué dans la synthèse de la progestérone, hormone dont dépendent les capacités de saillie et la qualité du sperme de l'étalon, ainsi que dans toutes les phases de la reproduction de la jument. Ses effets ont par ailleurs été mesurés dans des espèces où la fertilité est essentielle.

5b. Valeur nutritionnelle

EQUISTRO® β-CAROTIN apporte quotidiennement 500 mg de β-carotène qui, associé aux acides gras insaturés et aux vitamines A et E, jouerait un rôle dans la fécondité des juments et des étalons

6. Utilisation

Fertilité des étalons et poulinières
L'utilisation d'EQUISTRO® β-CAROTIN est recommandée lorsque le fourrage est moins riche en β-carotène, notamment de janvier à mai, ainsi qu'en période de reproduction :
- chez l'étalon, pour lequel l'aptitude à la saillie et la qualité du sperme sont des facteurs essentiels
- chez la jument poulinière, pour laquelle la qualité des chaleurs, le faible risque d'avortement et la qualité du colostrum, sont des avantages particulièrement recherchés

7. Mode d'emploi

Incorporer EQUISTRO® β-CAROTIN dans l'alimentation ou dans l'eau de boisson.
Doses recommandées (chevaux de taille standard) :
- juments poulinières : 2 mesures de 25 g par jour (soit 50 g par jour)
- étalons reproducteurs : 1 à 2 mesure(s) de 25 g par jour, en fonction de l'importance du service assuré
Durée d'administration : débuter l'administration 2 mois avant la période de monte, et poursuivre pendant toute la saison de monte (étalons) ou la durée de la gestation (poulinières)
N.B. Ce produit contient du fer pour lequel des seuils maximaux ont été définis; pour cette raison, la dose quotidienne ne devra pas dépasser 4000 g/cheval de 500 kg/jour

9. Précautions d'emploi

EQUISTRO B-CAROTIN

Aliment complémentaire pour chevaux reproducteurs, riche en β-carotène. Pour préparer les chevaux reproducteurs à la période de monte.

La formule d'EQUISTRO® β-CAROTIN ne contient aucun ingrédient susceptible de rendre positif le contrôle anti-dopage.

Présentation

Présentation 1 : Seau de 3 kg
Code GTIN 1 : 03605870080687